

Syphilis (Lues)

- **potentiell lebensbedrohliche Erkrankung**
- systemisch
- durch **Treponema pallidum** übertragen
- chronischer, stadienhafter Verlauf **mit freien Intervallen**
- **Eintrittspforte ist obligat**
- Inkubationszeit 3 –6 Wochen
- Stadien:
 - o **Frühsyphilis**
 - **Infektiös**
 - **Dauer < 1 Jahr**
 - o **Spätsyphilis**
 - **Nicht infektiös**
 - **Dauer > 1 Jahr**

Lues maligna: Besonders schwere Verlaufsform bei Immunsupprimierten.

Frühsyphilis:

Stadium I:

- Primäraffekt
 - o Schmerzlose Papel (**=Syphilitische Papel**)
 - **Hochinfektiös**
 - **Palmae und Plantae besonders betroffen**
 - o Derbes Ulcus mit hartem Randsaum (**= harter Schanker**)
- Primärkomplex
 - o **Primäraffekt „Bubo“ (=LK – Schwellung)**
 - o Einseitige, schmerzlose Lymphadenitis
 - o Der Ulcus heilt in ca. 6 Wochen **narbig** ab
- Der beste Test ist der **VDRL** (Suchtest)
 - o Sucht nach **Lipoid – AK. Titer sinkt unter Therapie ab.**
 - o Absinken des Titers um 2 Stufen
 - Beweis einer erfolgreichen Therapie

Stadium II: (nach 8 bis 12 Wochen)

- **Erstlingsexanthem am Stamm**
 - o **Nicht juckend!**
 - o Blassrosa
 - o Masernähnlich
 - o Oft seitwärts betont
- **DD: Arzneimittelreaktion (häufigste Fehldiagnose, juckend!)**
- Therapie:
 - o Benzathin – Penizillin – G i.m. 1x

Abklingendes Stadium:

- Leucoderma spezificum
- Alopecia specifica
- Angina specifica
- Plaques musqueuses
- Alopecia areolaris (Mottenfraß)

Gummen: (klassische Läsionen der Spätsyphilis)

- Können an jedem Organ auftreten
- Am häufigsten jedoch an Haut, SH und Knochen
- Nicht infektiös! Keine Treponemen!

Spätsyphilis :

- Syphilitide
- Gummen
- Kardiovaskuläre Symptome

Therapie:

- Benzathin – Penizillin – G i.m. 3x

Neurosyphilis (NS)

- Asymptomatische NS
- Meningovaskuläre NS
- Paralysis progressiva
- **Tabes dorsalis**

Therapie:

- **Penizillin – G (wässrig) in den ersten 21 Tagen 6 mal.**
 - **Depot – Penizillin passiert nicht die Blut – Hirn – Schranke)**